

ZEVENDE BIJDRAGE

TOT DE KENNIS DER

ICHTHYOLOGISCHE FAUNA

VAN

T E R N A T E (1),

DOOR

P. B L E E K E R.

Tijdens eene reis, onlangs gedaan naar de Moluksche eilanden in het gevolg van den gouverneur generaal van Nederlandsch Indië Mr. A. J. DUIJMAER VAN TWIST, heb ik het geluk gehad rijke verzamelingen van verschillende eilanden van den Molukschen Archipel te kunnen opdoen. Deze bijdrage het eerste resultaat zijnde mijner wetenschappelijke nasporingen tijdens die reis, is het mij eene aange-

(1) Mijne vorige bijdragen betrekkelijk dit onderwerp zijn te vinden als volgt.
Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Ternate. *Natuurk. Tijdschr.*
van Ned. Indië. IV 1853 p. 131—140.

Nieuwe bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Ternate en Halmaheira (Gilolo), *ibid.* IV p. 595—610.

Diagramma haematochir, eene nieuwe soort van Ternate, *ibid.* VI. 1854 p. 175—176.

Iets over visschen levende in zeesterren en over eene nieuwe soort van *Oxybelus*.
ibid. VII 1854 p. 162, 163.

Vijfde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Ternate, *ibid.* VIII, 1855 p. 295—328.

Over eenige nieuwe visschen van Ternate, *ibid.* IX 1855 p. 155.

name taak hier openlijk mijne hulde en de betuiging mijner erkentelijkheid te brengen aan den heere Mr. A. J. DUIJMAER VAN TWIST voor de belangstelling, waarmede hij mijne studiën heeft gadegeslagen en de voortreffelijke gelegenheid, waarin hij mij wel heeft willen stellen, om de reis vruchtbaar te doen zijn voor de wetenschap. Van vele eilanden, van noordelijk Celebes, Ternate, Batjan, Boeroe, Amboina, Saparoea en Banda heb ik meerdere honderden vischsoorten medegebragt, waarvan vele nog niet van die eilanden en vele ook nog niet in de wetenschap bekend waren. Ik hoop die verzamelingen achtereenvolgens te bewerken en de resultaten mijner nasporingen ten deze aan het wetenschappelijke publiek mede te deelen.

Deze bijdrage handelt uitsluitend over de vischfauna van Ternate. Reeds kende ik van daar een 151-tal vischsoorten, totdat ik het eiland zelf bezocht. Het was te vermoeden, dat er nog een' rijken oogst zou zijn te maken. En inderdaad, niettegenstaande ik slechts een drietal dagen te Ternate heb doorgebragt, dagen welke slechts voor een zeer gering gedeelte aan ichthyologische nasporingen konden worden gewijd, gelukte het mij er 133 vischsoorten bijeen te brengen. Deze visschen zag ik slechts voor een gering aantal op de markt te Ternate, waar slechts weinige soorten en in geringe hoeveelheid werden te koop gebragt. Een' rijken buit maakte ik echter tijdens de ebbe, op de koraalriffen, welke zich voor de hoofdplaats in zee uitstrekken, en vrij talrijke soorten ook werd ik meester tijdens een vischpartijtje met een treknet, waartoe de heer VAN DUVENBODE, een zeer kundig en verdienstelijk ingezetene van Ternate, mij wel had willen uitnoodigen. Van de visschen, op de markt gekocht, heb ik de namen kunnen aanteekenen, waaronder zij te Ternate bekend zijn. Ten opzichte der overige visschen ontbrak mij daartoe de tijd en de aanwezigheid van deskundige personen.

Het resultaat van mijne weinige dagen verblijf mogt ik

zeer bevredigend noemen. Van de 133 soorten daar opgedaan, zijn niet minder dan 82 nieuw voor de kennis der vischfauna van Ternate, 26 nieuw voor de kennis der Moluksche wateren en 8 nieuw voor de wetenschap.

De bedoelde soorten zijn de volgende:

Species piscium ternatenses quas in itinere per Archipelagum Moluccense observavit P. Bleeker.

- 1* Apogon bandanensis Blkr.
- 2* " fraenatus Val.
- 3* " Hartzfeldii Blkr.
- 4* " Hoevenii Blkr.
- 5* " hypselonotus Blkr.
- 6* " novemfasciatus CV.
- 7* Apogonichthys gracilis Blkr. = *Djalufu* Tern.
- 8* Serranus alboguttatus CV.
- 9* " guttatus CV. = *Goropa nussu merang* Tern.
- 10 " hexagonatus CV. = *Goropa babintang* Tern.
- 11 " horridus K. v. II. = *Goropa roto* Tern.
- 12 " marginalis CV.
- 13 " leucogrammicus Rwdt = *Kokofa* Tern.
- 14 " spilurus CV.
- 15 " punctulatus CV. = *Goropa mejrah* Tern.
- 16* " urodelus CV. = *Niku madodera* Tern.
- 17 Mesoprion amboinensis Blkr.
- 18* " bottonensis Blkr.
- 19 " fulvisflamma Blkr. = *Gorara furo* Tern.
- 20* " marginatus Blkr. = *Gadja kuning* Tern.
- 21 " monostigma Blkr.
- 22* " octolineatus Blkr. = *Gorara tikus* Tern.
- 23* " Russellii Blkr.
- 24* " vitta Blkr.
- 25* Holocentrum punctatissimum CV.
- 26 " sammara CV.
- 27* Percis cylindrica CV.
- 28* Sphyraena langsar Blkr. = *Sagalu* Tern.
- 29 " obtusata CV. = *Sagalu* Tern.

- 30 * *Upeneus barberinus* CV. = *Bidjinangka* Tern.
31 " *trifasciatus* CV. = *Bidjinangka* Tern.
32 * *Upeneoides variegatus* Blkr = *Bidjinangka* Tern.
33 *Mulloidides flavolineatus* Blkr. = *Bidjinangka* Tern.
34 * *Scorpaena polylepis* Blkr.
35 * *Scolopsides lineatus* QG. = *Sisidemo* Tern.
36 " *monogramma* K. v. H.
37 * *Diagramma lineatum* CV.
38 * *Lethrinus ornatus* CV. = *Gotila* Tern.
39 * " *rhodopterus* Blkr. = *Gotila* Tern.
40 * *Caesio chrysozonus* K. v. H. = *Lolossi* Tern.
41 " *coerulaureus* Lac.
42 * " *pisang* Blkr = *Lolossi mejrah* Tern.
43 * " *gymnopterus* Blkr. = *Lolossi biru* Tern.
44 *Chaetodon citrinellus* Brouss.
45 " *dorsalis* Rwdt. = *Kalibobo* Tern.
46 * " *nesogallicus* CV.
47 " *princeps* CV.
48 " *virescens* CV. = *Kalibobo* Tern.
49 " *vagabundus* Bl.
50 " *vittatus* Bl. = *Kalibobo* Tern.
51 *Zanclus cornutus* CV.
52 *Holacanthus Vrolikii* Blkr.
53 * *Chorinemus tolo* CV.
54 *Selar boöps* Blkr = *Otji* Tern.
55 " *torvus* Blkr = *Noru* Tern.
56 * *Caranx ekala* CV. = *Bobara* Tern.
57 " *Forsteri* CV. = *Bobara* Tern.
58 * *Amphacanthus margaritiferus* CV.
59 * " *marmoratus* CV. = *Uhi* Tern.
60 * *Acanthurus celebicus* Blkr.
61 " *matoides* CV. = *Gotannah* Tern.
62 " *strigosus* Benn.
63 " *triestegus* Cuv.
64 * *Naseus amboinensis* Blkr.
65 * " *annulatus* Blkr.
66 *Atherina duodecimalis* CV. = *Kapala batu* Tern.
67 *Petroskirtes Temminckii* Blkr = *Tabakko* Tern.
68 * *Salarias cyanostigma* Blkr.

- 69* *Salarias phaiosoma* Blkr.
 70* " *periophthalmus* CV.
 71* " *quadripinnis* CV.
 72* " *Sebae* CV.?
 73* *Callionymus ocellatus* Pall.
 74* *Gobius phalaena* CV.
 75* " *puntangoïdes* Blkr.
 76* " *erythrophaeos* Blkr.
 77 *Fistularia immaculata* Comm. = *Trompetta* Tern.
 78* *Plesiops coeruleolineatus* Rüpp.
 79* *Pseudochromis fuscus* Müll. Trosch.
 80* " *polyacanthus* Blkr.
 81* *Pomacentrus bankanensis* Blkr.
 82 " *moluccensis* Blkr.
 83 " *pavo* Lac.
 84* " *tapeinosoma* Blkr = *Motote* Tern.
 85* *Dascyllus melanurus* Blkr.
 86 *Glyphisodon lacrymatus* CV. = *Ngomi hitam* Tern.
 87 " *ternatensis* Blkr. = *Kutjia* Tern.
 88 " *trifasciatus* Blkr. = *Kutjia kuning* Tern.
 89* " *unimaculatus* CV.
 90 *Heliases fraenatus* CV. = *Ngomi hidju* Tern.
 91* " *ternatensis* Blkr = *Ngomi hidju* Tern.
 92 *Cheilio hemichrysos* CV.
 93* *Julis (Julis) dorsalis* QG. = *Soh karang* Tern.
 94 " (") *lunaris* CV. = *Biru-biru* Tern.
 95 " (*Halichoeres*) *bandanensis* Blkr = *Soh* Tern.
 96* " (") *balteatus* QG.
 97* " (") *Hoevenii* Blkr.
 98* " (") *dieschismenacanthoides* Blkr.
 99 " (") *kallosoma* Blkr.
 100* " (") *miniatus* K. v. H.
 101* " (") *Renardi* Blkr.
 102* " (") *strigiventer* Benn. = *Bolebole* Tern.
 103* *Xyrichtys pavo* CV.
 104* *Novacula Twistii* Blkr = *Bokki* Tern.
 105* " *punctulata* CV.
 106* *Cheilinus radiatus* Blkr = *Gaganim* Tern.
 107 " *tetrazona* Blkr.
 108* *Scarus aeruginosus* CV.

- 109 * *Scarus coeruleopunctatus* Rüpp.
- 110 * *Callyodon hypselosoma* Blkr.
- 111 *Belone cylindrica* Blkr = *Sakku* Tern.
- 112 * " *schismatorhynchos* Blkr = *Sakku* Tern.
- 113 *Hemiramphus Russellii* CV. = *Ongwaru* Tern.
- 114 *Clupeoides macassariensis* Blkr = *Kesau* Tern.
- 115 * *Harengula melanurus* Blkr = *Biki hokko* Tern.
- 116 * *Engraulis Russellii* Blkr = *Ubeh* Tern.
- 117 * *Saurus synodus* CV. = *Totati* Tern.
- 118 *Saurida nebulosa* CV.
- 119 * *Rhombus Mogkii* Blkr = *Memah* Tern.
- 120 * *Muraena bullata* Richds.
- 121 * " *colubrina* Richds.
- 122 * " *florisiana* Blkr.
- 123 * " *lita* Richds.
- 124 * " *monochrous* Blkr = *Ladu* Tern.
- 125 * " *Duivenbodei* Blkr.
- 126 * " *Troschellii* Blkr.
- 127 * *Moringua microchir* Blkr.
- 128 * *Erythron niger* Rüpp. = *Tato batu* Tern.
- 129 *Balistes lineatus* Bl. = *Tato tombaga* Tern.
- 130 " *praslinus* Lac. = *Tato karang* Tern.
- 131 *Ostracion cubicus* Bl. = *Kabila* Tern.
- 132 * *Tropidichthys Bennetti* Blkr.
- 133 *Syngnathus haematopterus* Blkr.

De met een * gemerkte soorten waren nog niet van Ternate bekend. Nieuw voor de kennis der fauna van de Molukken zijn: *Apogon hypselonotus* Blkr, *Apogonichthys gracilis* Blkr, *Holocentrum punctatissimum* CV., *Lethrinus rhodopterus* Blkr, *Caesio gymnopterus* Blkr, *Acanthurus celebicus* Blkr, *Salarias phaiosoma* Blkr, *Salarias periophthalmus* CV., *Salarias Sebae* CV?, *Gobius erythrophaios* Blkr, *Pseudochromis polyacanthus* Blkr, *Pomacentrus tapeinosoma* Blkr, *Glyphisodon unimaculatus* CV., *Helias ternatensis* Blkr., *Xyrichtys pavo* CV., *Novacula Twistii* Blkr, *Novacula punctulata* CV., *Belone schismatorhynchos* Blkr, *Rhombus Mogkii* Blkr, *Muraena bullata*.

Richds., *Muraena florisiana* Blkr, *Muraena monochrous* Blkr, *Muraena Duivenbodei* Blkr, *Muraena Troscheli* Blkr en *Erythrodon niger* Rüpp.

Van die soorten beschouw ik als nieuw voor de wetenschap: *Apogonichthys gracilis*, *Caesio gymnopterus*, *Pseudochromis polijacanthus*, *Pomacentrus tapeinosoma*, *Helias ternatensis*, *Novacula Twistii*, *Muraena monochrous* en *Muraena Duivenbodei*

SPECIES PISCIIUM TERNATENSES HUCUSQUE COGNITAE.

- 1 Cheilodipterus quinquelineatus CV. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. II, p. 253.
- 2 Apogon bandanensis Blkr. ib. VI, p. 95.
- 3 " fraenatus Val. = Apogon vittiger Benn. sub. nom. Apogon melanorhynchus Blkr. ib. III, p. 255.
- 4 " Hartzfeldii Blkr, ibid. VI, p. 482.
- 5 " Hoevenii Blkr, ib. VI, p. 483.
- 6 " hypselonotus Blkr, ib. VIII, p. 309.
- 7 " koilomatodon Blkr, ibid. IV, p. 134.
- 8 " maeropterus K. v. H., ibid. II, p. 168.
- 9 " novemfasciatus CV., ibid. III, p. 163.
- 10 Apogonichthys gracilis Blkr, ibid. X, p. 371.
- 11 Serranus alboguttatus CV., ib. VI, p. 191.
- 12 " guttatus CV. = Serranus cyanostigmatoïdes Blkr Verh. Bat. Gen. XXII, Perc.
- 13 " hexagonatus CV., Nat. T. N. Ind. VI, p. 191.
- 14 " Hoevenii Blkr, Verh. B. Gen. XXII, Perc.
- 15 " horridus K. v. H., ibid.
- 16 " leucogrammicus Rwdt, ibid.
- 17 " marginalis CV., ibid.
- 18 " microprius Blkr, Nat. T. Ned. Ind. III, p. 552.
- 19 " myriaster CV., ibid. VI, p. 192.
- 20 " pardalis Blkr, Verh. Bat. Gen. XXII, Perc.
- 21 " punctulatus CV., Nat. T. N. Ind. III, p. 570.
- 22 " Sebae Blkr, ibid. VI, p. 488.
- 23 " spilurus CV., ibid. VI, p. 322.
- 24 " urodelus CV., ibid. VII, p. 38.
- 25 Plectropoma maculatum CV., ibid. VII, p. 418.

- 26 *Mesoprion amboinensis* Blkr, ibid. III, p. 259.
- 27 " *bottonensis* Blkr. = *Mesoprion janthinurus* Blkr,
ib. II p. 170, VI, p. 52.
- 28 " *chrysotaenia* Blkr, ibid. III, p. 259.
- 29 " *decussatus* CV., Verh. B. Gen. XXII, Perc.
- 30 " *fulviflamma* Blkr. = *Mesoprion unimaculatus* QG.
CV. = *DiaCOPE fulviflamma* CV. Rüpp. Nat. T.
Ned. Ind. III, p. 553.
- 31 " *lineolatus* Blkr, Verh. B. Gen. XXII, Perc.
- 32 " *marginatus* Blkr, Nat. T. N. Ind. III, p. 554.
- 33 " *microchir* Blkr, ibid. V, p. 332.
- 34 " *monostigma* CV? Verh. Bat. Gen. XXII, Perc.
- 35 " *octolineatus* Blkr, ibid.
- 36 " *Russellii* Blkr, ibid.
- 37 " *vitta* Blkr, ibid.
- 38 *Therapon servus* CV., ibid.
- 39 *Holocentrum diadema* CV., Nat. T. N. Ind. III, p. 259.
- 40 " *leonoïdes* Blkr, Verh. B. Gen. XXII, Perc.
- 41 " *punctatissimum* CV., Nat. T. N. Ind. IV, p. 248.
- 42 " *sammara* CV., ibid. III, p. 555.
- 43 " *tiereoïdes* Blkr, ibid. V, p. 334.
- 44 *Myripristis adustus* Blkr, ibid. IV, p. 108.
- 45 " *parvidens* CV?, ibid. III, p. 260.
- 46 " *pralinius* CV., ibid. II, p. 234.
- 47 *Percis cylindrica* CV., ibid. II, p. 235.
- 48 *Sphyraena Commersonii* CV., ibid. VII, p. 425. Verh. Bat.
Gen. XXVI, *Sphyraen*.
- 49 " *jello* CV., ibid. VII, p. 369, ibid.
- 50 " *langsar* Blkr, ibid. VII, p. 367, ibid.
- 51 " *obtusata* CV., ibid. VII, p. 364, ibid.
- 52 *Polynemus kuru* Blkr, Nat. T. N. Ind. IV, p. 600.
- 53 *Upeneus barberinus* CV., ibid. II, p. 172.
- 54 " *barberinoïdes* Blkr, ibid. III, p. 262.
- 55 " *Russellii* CV., Verh. Bat. Gen. XXII, Perc.
- 56 " *trifasciatus* CV., Nat. T. N. Ind. II, p. 237.
- 57 *Upeneoïdes variegatus* Blkr, Verh. B. Gen. XXII, Perc.
- 58 *Mulloïdes flavolineatus* Blkr, Nat. T. N. Ind. III, p. 697.
- 59 " *vanicolensis* Blkr, ibid. IV, p. 601.

- 60 *Dactylopterus orientalis* CV., *ibid.* III, p. 264.
- 61 *Pterois volitans* CV., *Verh. Bat. Gen.* XXII, Sclerop.
- 62 *Scorpaena polylepis* Blkr, *Nat. T. N. Ind.* II, p. 173.
- 63 *Platycephalus isacanthus* CV. *ib.* II. p. 481, III, p. 63.
- 64 *Synanceia brachio* CV., *Verh. Bat. Gen.* XXII, Sclerop.
- 65 *Diagramma crassispinum* Rüpp. *ib.* XXIII, Sciaen.
- 66 " *Goldmanni* Blkr, *Nat. T. Ned. Ind.* IV, p. 602.
- 67 " *haematochir* Blkr, *ibid.* VI, p. 175.
- 68 " *Lessonii* CV., *ibid.* IV, p. 463.
- 69 " *lineatum* CV., *ibid.* IV, p. 112.
- 70 " *plectorhynchus* CV., *Verh. B. Gen.* XXIII, Sciaen.
- 71 *Scolopsides bilineatus* CV., *ibid.*
- 72 " *lineatus* QG. *Nat. T. N. Ind.* V, p. 73.
- 73 " *monogramma* K. v. H., *Verh. B. G.* XXIII, Sciaen.
- 74 *Heterognathodon bifasciatus* Blkr, *ibid.*
- 75 " *xanthopleura* Blkr, *ibid.*, *Nat. T. N. Ind.* I, p. 101.
- 76 *Lethrinus ornatus* CV. = *Lethrinus xanthotaenia* Blkr, *ibid.*
II. p. 176.
- 77 " *rhodopterus* Blkr, *ibid.* III, p. 65.
- 78 *Caesio chrysozona* K. v. H., *Verh. Bat. Gen.* XXIII, Maen.
- 79 " *coerulaureus* Lac., *ibid.*
- 80 " *gymnopterus* Blkr, *Nat. T. N. Ind.* X, p. 372.
- 81 " *pisang* Blkr, *ibid.* IV, p. 113.
- 82 *Gerres filamentosus* CV., *Verh. B. Gen.* XXIII, Maen.
- 83 *Chaetodon baronessa* CV., *Nat. T. N. Ind.* III, p. 239.
- 84 " *citrinellus* Brouss., *ibid.* V, p. 50.
- 85 " *dorsalis* Rwdt, *ibid.* II, p. 240.
- 86 " *ephippium* CV., *ibid.* V, p. 337.
- 87 " *falcula* Bl., *ibid.* VIII, p. 311.
- 88 " *Kleinii* CV.,
- 89 " *lunula* CV., *Nat. T. N. Ind.* V, p. 57.
- 90 " *nesogallicus* CV., *ibid.* II, p. 40.
- 91 " *oligacanthus* Blkr, *ib.* I, p. 105. *Verh. Bat. Gen.*
XXIII, Chaet.
- 92 " *oxycephalus* Blkr, *Nat. T. Ned. Ind.* IV, p. 603.
- 93 " *princeps* CV., *Verh. B. Gen.* XXIII, Chaet.
- 94 " *vagabundus* Bl., *ibid.*
- 95 " *virescens* CV., *ibid.*

- 96 *Chaetodon vittatus* Bl., *ibid.*
- 97 *Heniochus melanistion* Blkr, *Nat. T. N. Ind. VI*, p. 98.
- 98 *Zanclus cornutus* CV., *Verh. B. Gen. XXIII*, *Chaet.*
- 99 *Holacanthus bicolor* CV., *Nat. T. N. Ind. V*, p. 77.
- 100 *Holacanthus leucopleura* Blkr, *ibid. V*, p. 79.
- 101 " *Vrolikii* Blkr, *ibid. V*, p. 339.
- 102 *Pempheris molucca* CV., *Verh. Bat. Gen. XXIII*, *Chaet.*
- 103 " *oualensis* CV., *Nat. T. N. Ind. II*, p. 242.
- 104 *Pimclepterus ternatensis* Blkr, *ibid. IV*, p. 604.
- 105 *Toxotes jaculator* CV., *Verh. Bat. Gen. XXIII*, *Chaet.*
- 106 *Scomber loo* CV., *ibid. XXIV*, *Makr.*
- 107 *Auxis thynnoïdes* Blkr, *Nat. T. N. Ind. VIII*, p. 301.
- 108 *Chorinemus sancti Petri* CV., *Verh. Bat. Gen. XXIV*, *Makr.*
- 109 " *toloo* CV., *ibid.*
- 110 *Decapterus lajang* Blkr, *Nat. T. N. Ind. VIII*, p. 302.
- 111 *Selar boöps* Blkr., *Verh. B. Gen. XXIV*, *Makr.*
- 112 " *torvus* Blkr, *ibid.*
- 113 *Caranx ekala* CV., *ibid.*
- 114 " *Forsteri* CV., *ibid. Nat. T. N. Ind. III*, p. 164.
- 115 *Carangoïdes blepharis* Blkr, *Verh. Bat. Gen. XXIV*, *Makr.*
- 116 " *hemigymnostethus* Blkr, *ibid. Nat. T. N. Ind. I*, p. 364.
- 117 *Gnathanodon speciosus* Blkr, *Verh. Bat. Gen. XXIV*, *Makr.*
- 118 *Equula ensifera* CV., *ibid.*
- 119 *Amphacanthus cyanotaenia* Blkr, *Nat. T. N. Ind. IV*, p. 606.
- 120 " *doliatus* CV., *ibid. IV*, p. 605.
- 121 " *dorsalis* CV., *Verh. Bat. Gen. XXIII*, *Teuth.*
- 122 " *margaritiferus* CV.
- 123 " *marmoratus* CV. = *Amphacanthus scaroides*
Blkr, *Nat. T. N. Ind. IV*, p. 262.
- 124 " *vulpinus* Schl. Müll., *ibid. IV*, p. 135.
- 125 *Acanthurus celebicus* Blkr, *ibid. III*, p. 162.
- 126 " *matoïdes* CV., *Verh. Bat. Gen. XXIII*, *Teuth.*
- 127 " *scopas* CV., *Nat. T. N. Ind. II*, p. 348.
- 128 " *strigosus* Benn., *ibid. IV*, p. 264.
- 129 " *triestegus* CV., *Verh. Bat. Gen. XXIII*, *Teuth.*
- 130 *Naseus amboinensis* Blkr = *Keris amboinensis* Blkr, *Nat. T. Ned. Ind. III*, p. 272.

- 131 *Naseus annulatus* Blkr = *Priodon annularis* CV., ibid. IX,
p. 304.
- 132 *Atherina duodecimalis* CV., ibid. II, p. 485.
- 133 *Petroskirtes Temminckii* Blkr, ibid. II, p. 243.
- 134 *Petroskirtes Thepassii* Blkr, ibid. IV, p. 136.
- 135 *Salarias cyanostigma* Blkr, Verh. B. Gen. XXII. Blenn. Gob.
- 136 " *periophthalmus* CV., Nat. T. N. Ind. IV, p. 267.
- 137 " *phaiosoma* Blkr, ibid. VIII, p. 317.
- 138 " *quadripinnis* CV., Verh. Bat. Gen. XXII, Blenn.
- 139 " *Sebae* CV?, Nat. T. N. Ind. X, p. 373.
- 140 *Callionymus ocellatus* Pall., ibid. VIII, p. 422.
- 141 *Gobius erythrophaios* Blkr, Verh. B. Gen. XXII, Gob.
- 142 " *phalaena* CV., Nat. T. N. Ind. II, p. 244.
- 143 " *puntangoïdes* ibid. V, p. 242.
- 144 *Polypterichthys Valentini* Blkr, ibid. IV, p. 608.
- 145 *Fistularia immaculata* Comm., ibid. III, p. 281.
- 146 *Amphisile scutata* Cuv., ibid. II, p. 245.
- 147 *Echeneis neucrates* L., Verh. Bat. Gen. XXIV, Chir. etc.
- 148 *Plesiops coeruleolineatus* Rüpp., Nat. T. N. Ind. IV, p. 116
- 149 *Pseudochromis fuscus* Müll, Trosch., ibid. IX, p. 69.
- 150 " *polyacanthus* Blkr, ibid. X, p. 375.
- 151 *Amphiprion chrysargurus* Richds. (sub nom. *Amphiprion xanthurus* Blkr) ib. III, p. 560.
- 152 *Pomacentrus bankanensis* Blkr (sub nom. *Pomac. tacniops*
CV.) ib. V, p. 512.
- 153 " *katunko* Blkr, ibid. III, p. 169.
- 154 " *moluccensis* Blkr, ibid. IV, p. 118.
- 155 " *nematopterus* Blkr, ibid. III, p. 285.
- 156 " *notophthalmus* Blkr, ibid. IV, p. 137.
- 157 " *pavo* Lac., ibid. II, p. 247.
- 158 " *tapeinosoma* Blkr, ibid. X, p. 376.
- 159 *Dascyllus aruanus* CV., ibid. VI, p. 108.
- 160 " *melanurus* Blkr, ibid. VI, p. 109.
- 161 *Glyphisodon lacrymatus* CV., ibid. VIII, p. 303.
- 162 " *rahti* CV., ibid. III, p. 287.
- 163 " *Schlegelii* Blkr, ibid. IV, p. 138.
- 164 " *ternatensis* Blkr, ibid. IV, p. 137.

- 165 *Glyphisodon trifasciatus* Blkr, Verh. B. Gen. XXI, Labr. cten.
- 166 " *unimaculatus* CV., Nat. T. N. Ind. IV, p. 284.
- 167 *Heliases fraenatus* CV., ibid. II, p. 710.
- 168 " *ternatensis* Blkr, ibid. X, p. 377.
- 169 " *xanthochir* Blkr, ibid. II, p. 248.
- 170 *Cossyphus macrodon* Blkr, Verh. B. G. XXII, Gladsch. Labr.
- 171 *Cheilio hemichrysos* CV., Nat. T. N. Ind. II, p. 255.
- 172 *Julis (Julis) dorsalis* QG., ibid.
- 173 " (") *lunaris* CV., Verh. B. Gen. XXII, Gladsch. Labr.
- 174 " (*Halichoeres*) *bandanensis* Blkr, Nat. T. N. Ind. ibid.
II, p. 254.
- 175 " (") *balteatus* QG., ibid. II, p. 253.
- 176 " (") *binotopsis* Blkr, ibid. III, p. 170.
- 177 " (") *dieschismenacanthus* Blkr, ibid. III, p. 645.
- 178 " (") *dieschismenacanthoides* Blkr, ib. IV, p. 121.
- 179 " (") *Harloffii* Blkr, Verh. B. Gen. XXII,
Gladsch. Labr.
- 180 " (") *Hoevenii* Blkr, Nat. T. N. Ind. II, p. 250.
- 181 " (") *kalosoma* Blkr, ibid. III, p. 289.
- 182 " (") *miniatus* K. v. II., ibid. III, p. 171.
- 183 " (") *Renardi* Blkr, ibid. II, p. 253.
- 184 " (") *Schwarzii* Blkr, Verh. Bat. Gen. XXII,
Ichth. Bali.
- 185 " (") *strigiventer* Benn., N. T. N. Ind. II, p. 251
- 186 *Xyrichthys pavo* CV., Nat. T. N. Ind. X, p. 378.
- 187 *Novacula Twistii* Blkr, ibid. X, p. 381.
- 188 " *punctulata* CV., ibid. V, p. 170.
- 189 *Cheilinus decacanthus* Blkr, ibid. II, p. 256.
- 190 " *radiatus* Blkr = *Cheilinus diagrammus* CV., Verh.
B. Gen. XXII, Gladsch. Labr.
- 191 " *tetrazona* Blkr, Nat. T. N. Ind. IV, p. 293.
- 192 *Scarus aeruginosus* CV., Verh. B. G. XXII, Gladsch. Labr.
- 193 " *coeruleopunctatus* Rüpp., Nat. T. N. Ind. VI, p. 110.
- 194 " *janthochir* Blkr, ibid. IV, p. 139.
- 195 " *Quoyi* CV., ibid. IV, p. 607.
- 196 *Callyodon hypselosoma* Blkr, ibid. VIII, p. 425.
- 197 " *vaigiensis* CV., ibid. II, p. 256.

- 198 *Belone cylindrica* Blkr, Verh. Bat. Gen. XXIV, Snoek.
- 199 " *schismatorhynchus* Blkr, ibid., Nat. T. N. Ind. I, p. 95.
- 200 *Hemiramphus Commersonii* CV., Verh. B. Gen. XXIV, Snoek.
- 201 " *Russellii* CV., ibid.
- 202 *Exocoetus mento* CV., ibid.
- 203 *Clupeoides macassariensis* Blkr, ib., Nat. T. N. Ind. III, p. 772.
- 204 *Harengula melanurus* Blkr, Nat. T. N. Ind. V, p. 105.
- 205 " *moluccensis* Blkr, ibid. IV, p. 609.
- 206 *Spratelloides argyrotaenia*, ibid. III, p. 775. Verh. Bat. Gen. XXIV, Har.
- 207 *Engraulis Russellii* Blkr, Verh. Bat. Gen. XXIV, Har.
- 208 *Saurus synodus* CV., ibid. XXIV, Chir., Nat. T. N. Ind. II. p. 257.
- 209 *Saurida nebulosa* CV., Nat. T. N. Ind. III, p. 292.
- 210 *Rhombus Mogkii* Blkr, ibid. VII, p. 256.
- 211 *Oxybeles Brandesii* Blkr, ibid. I. p. 276, VII, p. 162.
- 212 *Moringua microchir* Blkr, ibid. IV, p. 124. Verh. B. Gen. XXV Mur.
- 213 *Muraena bullata* Richds., ib. IX, p. 276.
- 214 " *colubrina* Richds. ib. VI, p. 335.
- 215 " *florisiana* Blkr, ib. VI, p. 334.
- 216 " *isingleena* Richds. = *Muraena isingleenoides* Blkr, ib. IX. p. 277. Verh. B. Gen. XXV, Mur.
- 217 " *lita* Richds., ib. III, p. 294. ibid. N. T. Ind. X, p. 383.
- 218 " *monochrous* Blkr, Nat. T. N. Ind. X, p. 384.
- 219 " *Duivenbodei* Blkr, ibid. X, p. 385.
- 220 " *Troschelii* Blkr, ib. VII, p. 101. Verh. Bat. Gen. XXV, Muraen.
- 221 *Arothron virgatus* Blkr. = *Tetraodon virgatus* Richds., ib. III, p. 299, Verh. B. Gen. XXIV, Blook.
- 222 *Tropidichthys Bennetti* Blkr, Nat. T. N. Ind. VI, p. 504.
- 223 " *striolatus* Blkr, ibid. VI, p. 503.
- 224 *Diodon punctatus* Cuv., Verh. B. Gen. XXIV, Blook.
- 225 *Erythron niger* Rüpp. = *Xenodon niger* Rüpp. ibid. XXIV, Balist.
- 226 *Balistes lineatus* Bl., ibid.
- 227 " *praslinus* Lac. ibid.

- 228 *Monacanthus Cantoris* Blkr, *ibid.*, Nat. T. N. Ind. III, p. 80.
229 " *Houttuyni* Blkr, Nat. T. N. Ind. V, p. 533.
230 " *tomentosus* Cuv., Verh. Bat. Gen. XXIV, Balist.
231 *Ostracion cubicus* Bl., *ibid.* Ostrac.
232 *Syngnathus haematopterus* Blkr, *ib.* XXV, Trosk.
233 *Solenognathus Blochii* Blkr, *ibid.*

DESCRIPTIONES SPECIERUM DIAGNOSTICAE.

PERCOIDEI.

Apogonichthys gracilis Blkr.

Apogon. corpore subelongato compresso, altitudine $4\frac{1}{2}$ ad 5 in ejus longitudine, latitudine 2 circiter in ejus altitudine; capite $3\frac{1}{2}$ circiter in longitudine corporis; altitudine capitis $1\frac{1}{2}$ circiter in ejus longitudine; oculis diametro 3 fere ad 3 in longitudine capitis, multo minus diametro 1 distantibus; linea rostro-frontali fronte declivi rectiuscula; rostro convexo angulato; orbita ubique glabra; osse suborbitali, crista praeoperculi intramarginali osseque suprascapulari edentulis; maxilla superiore maxilla inferiore paulo brevior sub oculi dimidio anteriore desinente; dentibus maxillis pluriseriatis minimis aequalibus, vomerinis in thurram $\wedge$ formem, palatinis utroque latere in vittam gracillimam vix conspicuam dispositis; praeoperculo rotundato; operculo spina nulla; linea dorsali linea ventrali non convexiore; squamis lateribus 25 p. m. in serie longitudinales; pinna dorsali spinosa pinna dorsali radiosa humilior spinis gracilibus 1a ceteris longior corpore duplo circiter humilior; dorsali radiosa antice acuta, nec convexa nec emarginata, corpore multo humilior; pectoralibus acute rotundatis 4 ad $4\frac{1}{4}$, ventralibus acutis 7 ad 8, caudali emarginata lobis acutis $4\frac{1}{3}$ circiter in longitudine corporis; anali antice acuta dorsali radiosa non vel vix humilior, paulo emarginata; colore corpore aureo, inferne dilutior; vitta rostro-oculo-operculari gracili fusca; pinnis roseis, caudali basi macula vel vitta transversa fusca et utroque lobo fascia intramarginali longitudinali fusca.

B. 7. D. 6— $1\frac{1}{9}$ vel 6— $1\frac{1}{10}$. P. $\frac{2}{10}$ vel $\frac{2}{11}$. V. $\frac{1}{5}$. A. $\frac{2}{12}$ vel $\frac{2}{13}$. C. 17 et lat. brev.

Habit. Ternate, in mari.

Longitudo 39 speciminum 38" ad 58".

Aanm. Deze soort maakt eene uitzondering op de vroeger door mij gegevene diagnose van het geslacht (Nat. Tijdschr. van 'Ned. Ind. VI p. 321) door hare uitgerande staartvin, welk kenmerk echter niet gewigtig genoeg is om haar tot een eigen geslacht te brengen. De diagnose van het geslacht kan dezefde blijven als men er de woorden „caudalis integra” uit weglaat. De soort is gemakkelijk herkenbaar aan hare uitgesnedene staartvin, slank ligchaam, talrijke aarsvinstralen, enz.

Ik kan thans ook mededeelen, dat mijne *Apogonichthys polystigma* (Nat. Tijdschr. Ned. VI p. 484) eene geheel andere soort is als *Apogon variegatus* Val., wat ik vroeger niet kon beoordeelen uit gemis van de Nouvelles Annales du Muséum d'Histoire naturelle, welk werk sedert ter mijner beschikking gekomen is.

MAENOÏDEI.

Caesio gymnopterus Blkr.

Caes. corpore elongato compresso, altitudine 7 circiter in ejus longitudine, latitudine $1\frac{1}{3}$ circiter in ejus altitudine; capite acuto $4\frac{1}{3}$ ad 5 in longitudine corporis; altitudine capitis $1\frac{2}{3}$ ad $1\frac{3}{4}$ in ejus longitudine; oculis diametro 3 ad $3\frac{1}{4}$ in longitudine capitis; linea rostro-frontali declivi rectiuscula; osse suborbitali pupillae diametro humiliore; rostro maxillis protractis tubulum oculo longiorem efficiente; maxilla superiore alepidota, ore clauso sub oculi margine anteriore desinente; dentibus maxillis vomerinisque minimis tactu magis quam visu conspicuis; praeoperculo margine posteriore obliquo angulo rotundato; operculo spina parva plana; squamis ctenoideis, lateribus 65 ad 70 in serie longitudinali; linea laterali rectiuscula, singulis squamis tubulo brevi vulgo simplice notata; pinna dorsali tota alepidota, parte spinosa parte radiosa multo altiore corpore multo minus duplo humiliore spinis gracilibus 2^a et 3^a ceteris longioribus, parte radiosa humiliori corpore plus duplo humiliore; pectoralibus acute rotundatis

$6\frac{1}{4}$ ad $6\frac{1}{2}$, ventralibus acutis $8\frac{1}{2}$ circiter, caudali profunde incisa lobis acutis 6 circiter in longitudine corporis; anali alepidota spinis gracilibus 1^a brevissima, 2^a et 3^a aequalibus radiis anteriori non brevioribus dorsali spinosa humilioribus; colore corpore superne coerulescente inferne margaritaceo; vittis dimidio corporis superiore 4 vel 5 longitudinalibus aureis; rostro fuscescente; pinnis hyalino-roseis.

B. 7. D. 9/15 vel 9/16. P. 2/19. V. 1/5. A. 3/12 vel 3/13. C. 1/15/1 et lat. brev.

Habit. Ternate, in mari.

Longitudo 32 speciminum 50" ad 107".

Aanm. Deze *Caesio* is nog het naaste verwant aan *Caesio striatus* Rüpp. en *Caesio pisang* Blkr. Zij is echter veel slanker van ligchaam en heeft den bek meer uitstreikbaar, de rugvin geheel schubloos, enz. Zij heeft in habitus des ligchaams en zeer uitstrekbaren bek veel van het geslacht *Emmelichthys*, en door de ploegbeenstandjes en ongeschubte rugvin verwantschap met *Maena*, doch hare bouw van ligchaam en vinnen is overigens geheel die van het geslacht *Caesio*. Aan de ploegbeenstandjes is in dit geslacht geene generische waarde te hechten, aangezien zij bij dezelfde soort in jeugdigeren leeftijd soms ontbreken en in den gevorderden leeftijd aanwezig zijn, zooals ik reeds eenige jaren geleden van *Caesio pinjalo* Blkr. vermeld heb.

BLENNIOIDEI.

Salarias Sebae CV. Poiss. XI p. 239?

Salar. corpore oblongo compresso, altitudine $4\frac{1}{3}$ circiter in ejus longitudine, latitudine $1\frac{3}{4}$ circiter in ejus altitudine; capite obtuso truncato-convexo $4\frac{2}{3}$ ad $4\frac{3}{4}$ in longitudine corporis, paulo longiore quam alto; fronte convexa; rostro obtuso truncato vix ante frontem prominente; oculis diametro $2\frac{2}{3}$ ad $2\frac{3}{4}$ in longitudine capitis; nucha utroque latere cirris p. m. 15 simplicibus in seriem trans-

versam dispositis; orbita naribusque cirro lato plurifimbriato oculo brevior; maxilla inferiore utroque latere dente canino valde conspicuo; labio superiore non crenato; cute laevi; linea laterali valde conspicua, post apicem pinnae pectoralis valde deflexa, cauda desinente; pinna dorsali partem spinosam inter et radiosam plus minusve emarginata, parte spinosa antice quam postice multo altiore spina 1^a spinis ceteris longiore interdum valde producta, spinis posterioribus dorsali radiosa obtusa convexa postice cum basi pinnae caudalis unita humilioribus; pectoralibus obtusis $4\frac{1}{2}$ ad $4\frac{1}{2}$, ventralibus $6\frac{1}{2}$ ad 7 fere, caudali obtusa convexa $4\frac{1}{2}$ ad 5 in longitudine corporis; anali dorsali radiosa multo humilior, inter singulos radios profunde incisa, postice cum caudali non unita, radiis anterioribus radiis sequentibus brevioribus; colore corpore violaceo; capite regioneque thoracica maculis rotundiuseulis sat confertis viridi-aureis; corpore violaceo-nigro reticulato; pinna dorsali violascente-fusca parte spinosa superne tota, parte radiosa superne antice tantum late laete rubra; pectoralibus basi profunde violaceis maculis viridi-aureis ceterum membrana hyalinis radiis inferioribus fuscis radiis ceteris aurantiacis; ventralibus fuscis aurantiacis; anali dimidio basali fuscis aurantiaca vitta longitudinali fusca, dimidio libero violaceo-fusca; caudali fuscis aurantiaca superne late rubra.

B. 6. D. 11/15. P. 15. V. 2. A. 17 vel 18. C. 2/9/2.

Synon. *Blennius fronte perpendiculariter declivi, ossiculo primo pinnae dorsalis alto* Seb. Thesaur. III tab. 30 fig. 5?

Habit. Ternate, in mari.

Longitudo 2 speciminum 67" et 74".

Variet. a. Corpore loco retis violacei-nigri maculis parvis et vittulis brevibus irregularibus laete rubris violaceo-nigro-limbatis.

Habit. Ternate, in mari.

Longitudo 2 speciminum 65" et 68".

Variet. b. Capite guttulis laete rubris violaceo-nigro annulatis corpore ubique guttulis sat confertis violaceo-nigris.

Habit. Ternate, in mari.

Longitudo 6 speciminum 57" ad 76".

Aanm. Ik ving deze soort te Ternate op het voor de stad zich uitstrekkend koraalrif, tijdens de ebbe. Zij is na

verwant aan *Salarias variolosus* CV. van Guam, door hare talrijke op eene dwarsche rei geplaatste nekdraden als anderzins, doch laatstgenoemde heeft andere getallen der vinstralen (D. 12/12. A. 14.), zeer kleine neusdraden, enz. Ook *Salarias variolatus* CV. van het eiland San Juan Fernandez heeft eene dergelijke rei dwarsche nekfinmbriën doch insgelijks andere getallen der vinstralen (D. 11/18. P. 13. A. 19.), ligchaam en vertikale vinnen dicht met kleine roode vlekjes versierd, enz. Mijne voorwerpen beantwoorden vrij wel aan de aangehaalde beschrijving en afbeelding van *Salarias Sebae*, indien men aanneemt, dat het door den heer VALENCIENNES waargenomen exemplaar, nog afkomstig uit het Kabinet des stadhouders, de kopdraden en de kleuren had verloren.

PSEUDOCHROMIDES.

Pseudochromis polyacanthus Blkr.

Pseudochr. corpore oblongo compresso, altitudine $4\frac{1}{4}$ ad $4\frac{1}{3}$ in ejus longitudine, latitudine $1\frac{1}{2}$ circiter in ejus altitudine; capite acuto $3\frac{2}{3}$ circiter in longitudine corporis; altitudine capitis $1\frac{1}{2}$ circiter in ejus longitudine; oculis approximatis diametro 3 circiter in longitudine capitis; linea rostro-dorsali convexa; maxilla superiore maxilla inferiore paulo brevior post oculum desinente capite minus duplo brevior; dentibus maxillis palatoque pluriseriatis parvis, maxilla superiore antice 2 conicis prominulis, maxilla inferiore antice 2 vel 4 conicis dentibus ceteris majoribus; dentibus vomerinis in vittam $\wedge$ formem, palatinis utroque latere in vittam gracilem dispositis; osse suborbitali oculi diametro plus duplo humilior; praeoperculo operculoque squamis parvis totis tectis; praeoperculo rotundato; squamis ctenoideis, lateribus 50 p. m. in serie longitudinali; linea laterali simplice antice dorsum versus adscendente porro rectiuscula sub media dorsali radiosa interrupta; pinna dorsali spinosa dorsali radiosa humilior spinis posteribus spinis anticis paulo tantum longioribus; dorsali radiosa postice rotundata corpore duplo circiter humilior; pectoralibus rotun-

dati $4\frac{2}{3}$ circiter, ventralibus obtusiusculis angulatis 8 circiter, caudali obtusa rotundata 6 circiter in longitudine corporis; anali dorsali radiosa non altiore postice rotundata, parte spinosa spina media spinis 1^a et 3^a longiore; corpore rufescente-viridi toto fusco decussato-reticulato; iride margine interno flava, margine externo fusca; operculo medio antice macula magna profunde fusca; pinnis imparibus fuscis aurantiaco marginatis, pectoralibus ventralibusque fuscescente-aurantiacis.

B. 6. D. 7/19 vel 7/20. P. 2/13. V. 1/5. A. 3/16 vel 3/17. C. 1/15/1 et lat. brev.

Habit. Ternate, in mari.

Longitudo speciminis unici 54".

Aanm. Alle tot nu toe bekende soorten van *Pseudochromis* hebben slechts 3 of 2 rugdoornen en eene kleine bekspleet. De onderwerpelijke onderscheidt zich van die alle door hare 7 rugdoornen en hare tot achter het oog verlengde bovenkaak. In habitus heeft zij veel van de soorten van *Plesiops*, doch hare kenmerken vallen geheel binnen die, welke de heeren J. MÜLLER en TROSCHEL voor het geslacht *Pseudochromis* hebben opgesteld. Zij is overigens nog gemakkelijk kenbaar aan de schaaqbordachtig-netsgewijze vlekteekening des ligchaams en groote donkerbruine operkelvlek.

LABROÏDEI CTENOÏDEI

Pomacentrus tapeinosoma Blkr.

Pomac. corpore oblongo compresso, altitudine 4 et paulo ad $3\frac{3}{4}$ in ejus longitudine, latitudine 2 circiter in ejus altitudine; capite obtuso convexo $4\frac{2}{3}$ ad $4\frac{1}{2}$ in longitudine corporis, aequae alto fere ac longo; oculis diametro 3 ad $3\frac{3}{4}$ in longitudine capitis; linea rostro-frontali convexa; osse suborbitali sub oculo oculi diametro plus duplo humiliore, aetate juvenili et provecta toto edentulo; dentibus maxillis obtusis anticis lateralibus majoribus, maxilla

superiore p. m. 50, maxilla inferiore p. m. 40; praeoperculo subrectangulo angulo rotundato margine posteriore leviter denticulato; operculo postice spinula plana parum conspicua; squamis lateribus 36 p. m. in serie longitudinali; linea laterali sub media pinna dorsali radiosa interrupta; pinna dorsali spinosa spinis gracilibus mediis et posticis subaequalibus corpore triplo circiter humilioribus, membrana interspinosa parum emarginata; dorsali radiosa obtuse rotundata corpore duplo circiter humiliore; pectoralibus obtusis rotundatis 5 fere, ventralibus acutis radio 1° producto $5\frac{2}{3}$ ad 6 fere, caudali profunde incisa lobis valde acutis superiore inferiore longiore 4 ad $3\frac{2}{3}$ in longitudine corporis; anali obtusa rotundata dorsali radiosa humiliore; colore corpore superne olivaceo marginibus squamarum profundiore, inferne antice aurantiaco postice roseo-margaritaceo; regione rostro-maxillo-thoracica maculis margaritaceo-coeruleis vulgo in series 3 longitudinales dispositis; squamis corpore pinnae caudali singulis macula parva coerulelescente; axilla speciminibus pluribus superne macula fusca; pinna dorsali fusco-violacea postice aurantiaca; pectoralibus ventralibusque aurantiaco-roseis; anali membrana violascente-rosea radiis aurantiaca; caudali fusciscente-aurantiaca.

B. 5. D. 12/14 vel 12/15. P. 2/20. V. 1/5. A. 2/15 vel 2/16 vel 2/17. C. 15 et lat. brev.

Habit. Ternate, in mari.

Longitudo 26 speciminum 47" ad 89".

Aanm. Deze soort is zeer gemakkelijk herkenbaar aan haar slanktelligchaam, lage geheel ongetande onderoogkuilsbeenderen, talrijke schubben en vinstralen, spitse staartvinkwabben, regelmatig bol profiel, kleuren, enz. Ik ontdekte haar in September 1855 op de vischmarkt te Ternate, waar zij bij honderden exemplaren dagelijks te koop werd aangeboden.

Helias ternatensis Blkr.

Helias. corpore oblongo compresso, altitudine $2\frac{2}{3}$ ad $2\frac{3}{4}$ in ejus longitudine, latitudine 3 circiter in ejus altitudine; capite $4\frac{1}{3}$ ad 5 in longitudine corporis, altiore quam longo; oculis diametro $2\frac{1}{3}$

ad $2\frac{3}{4}$ in longitudine capitis; linea rostro-frontali valde declivi convexiuscula; osse suborbitali oculo duplo circiter humiliore; dentibus maxillis pluriseriatis serie externa antice praesertim majoribus conicis; praeoperculo subrectangulo angulo rotundato supra angulum leviter emarginato; squamis lateribus 28 p. m. in serie longitudinali; linea laterali sub spinis dorsi posticis interrupta; pinna dorsali spinosa spinis mediis spinis ceteris paulo longioribus corpore plus triplo humilioribus; dorsali radiosa rotundata corpore duplo circiter humiliore; pinnis pectoralibus acutiuscule rotundatis 4 ad $4\frac{1}{4}$, ventralibus acutis radio 1^o producto 5 circiter, caudali profunde excisa lobis acutissimis superiore inferiore longiore $3\frac{1}{3}$ ad $3\frac{1}{2}$ in longitudine corporis; anali rotundata dorsali radiosa vix vel non humiliore spina 2^a radio 1^o brevior; colore corpore superne violascente-viridi, marginibus squamarum violascente-fusco, inferne argenteo; squamis capite maculis rotundiusculis margaritaceis; squamis dorso lateribusque singulis macula oblonga transversa dilute coerulea; pinna dorsali violacea; pectoralibus violascente-roseis basi pulchre flavis; ventralibus analique flavescentibus; caudali roseo-flavescente margine superiore et inferiore fascia lata profunde violacea.

B. 6. D. 12/11. P. 2/15. V. 1/5. A. 2/11. C. 15 et lat. brev.

Habit. Ternate, in mari.

Longitudo 3 speciminum 81" ad 94".

Aanm. Deze soort is na verwant aan *Heliases xanthochir* Blkr, doch onderscheidt er zich voldoende van door aanmerkelijk hooger ligchaam, veel hooger en kop, stomper en minder gebogen profiel, door een doorn minder in de rugvin, enz.

LABROÏDEI CYCLOÏDEI.

Novacula pavo Blkr.

Novac. corpore oblongo compresso, altitudine $3\frac{1}{4}$ ad $3\frac{1}{6}$ in ejus longitudine, latitudine $2\frac{3}{4}$ ad $2\frac{2}{3}$ in ejus altitudine; capite antice carinato obtusissimo $4\frac{2}{3}$ ad $4\frac{2}{5}$ in longitudine corporis, al-

tiore quam longo; linea rostro-frontali ante oculos valde convexa, rostro subverticali convexiuscula; oculis diametro $4\frac{1}{2}$ ad 6 in longitudine capitis, plus diametro $\frac{1}{2}$ a linea rostro-frontali remotis; osse suborbitali sub oculo oculi diametro duplo vel plus duplo altiore; naribus minimis punctiformibus; maxillis subaequalibus, superiore 3 ad 3 et paulo in longitudine capitis; dentibus maxillis pluriseriatis seriebus internis obtusis, serie externa acutis internis longioribus; utraque maxilla antice caninis 2 magnis curvatis divergentibus, intermaxillaribus ore clauso infra-maxillares amplectentibus; regione infraoculari posteriore regioneque operculi supero-anteriore squamis parcis; praeoperculo obtuse rotundato; squamis lateribus 30 p. m. in serie longitudinali; linea laterali sub radiis dorsalibus penultimis interrupta, regione suprascapulari valde convexa, tunc rectiuscula, singulis squamis tubulo vulgo simplice notata; pinna dorsali duplice, anteriore biradiata acutissima falciformi tota ejus longitudine a dorsali 2^a remota ex parte supra oculum inserta radiis flexilibus 1^o 2^o multo longiore corpore minus duplo humiliore; dorsali 2^a parte spinosa parte radiosa paulo humiliore spinis osseis pungentibus posteriore ceteris longiore membrana inter singulas spinas non emarginata, parte radiosa corpore quadruplo vel plus quadruplo humiliore postice acutangulo; pectoralibus acutis postice leviter emarginatis $5\frac{1}{4}$ ad $5\frac{1}{2}$ fere, ventralibus acutis radio 1^o plus minusve producto $5\frac{1}{2}$ fere ad $4\frac{2}{3}$, caudali obtusa convexa 7 circiter in longitudine corporis; anali antice rotundata dorsali 2^a paulo altiore, postice angulata; colore corpore superne viridescente-roseo, inferne dilutiore, marginibus squamarum aurantiaco; dorso sub spina 4^a macula semilunari transversa squama minore profunde violacea coeruleo cincta; regione postscapulari macula pinna pectorali vix majore diffusa pulchre flava, squamis in hac macula singulis vittula coerulea margini squamae posteriori parallela; regione praeoperculari et operculari vittulis irregularibus dilute coeruleis subreticulata; rostro vittulis parcis coeruleis; mento vittulis transversis coeruleis; vitta rostro-dorsali coerulea linea mediana unica aureo limbata; pinna dorsali 1^a rosea antice et superne coeruleo marginata; dorsali 2^a pulchre aurantiaca vittulis numerosis obliquis transversis undulatis coeruleis superne in vittam intramarginalem coeruleam transeuntibus; pectoralibus roseis radiis fissis anterioribus fascia longitudinali diffusa violascente; ventralibus roseis; anali auran-

tiaco-rosea vitta intramarginali continua coerulea et maculis rotundis et oblongis vittulisque brevibus coeruleis in series obliquas transversas undulatas dispositis; caudali rosea-aurantiaca basi coeruleo punctata, dimidio posteriore vittis 3 vel 4 transversis ex parte interruptis coeruleis.

B. 6. D. 2—7/1/11 vel 12 vel 2—7/2/10 vel 11. P. 2/10. V. 1/5.

A. 3/12 vel 3/13. C. 4/12/4 lat. brev. incl.

Synon. *Xyrichthys pavo* CV. Poiss. XIV p. 45 tab. 394.

Rason paon CV. ibid.

Xyrichthys pavoninus CV. ibid. p. 47.

Rason pavonin CV. ibid.

Habit. Ternate, in mari.

Ins. Cocos, in mari.

Longitudo 3 speciminum 243" ad 316".

Aanm. Deze soort is reeds beschreven en vrij goed afgebeeld in de groote Histoire naturelle des Poissons. Op die beschrijving teeken ik het volgende aan. De achteroogen en bovenoperkel-schubben zijn bij mijne beide voorwerpen zeer duidelijk waarneembaar en echte schubben, weshalve de soort tot Novacula en niet tot *Xyrichthys* behoort. De staartvin voorts is niet afgeknot maar zeer bol, zoo als ook de afbeelding aantoont. De beide stralen der 1^e rugvin zijn geheel buigzaam. De eerste 7 der 2^e rugvin daarentegen zijn doornachtig en niet buigzaam; dan volgt een buigzame enkele straal en dan de verdeelde. Er zijn 30 schubben op eene overlangsche rei, langs de zijlijn gemeten, doch 26 ongeveer tot aan de kieuwopening even boven de borstvinbasis. Van de blaauwe stipjes achter het oog en op de zijden laten mijne voorwerpen niets waarnemen, doch daarentegen zijn de kleuren der vinnen fraaijer en meer geschaakt en ook die des ligchaams eenigzins anders dan in de genoemde beschrijving en afbeelding is uitgedrukt.

Deze soort was tot nog toe slechts bekend van Mauritius, Bourbon en de Sandwichseilanden. Het lijdt toch in mijn oog geen twijfel dat *Xyrichthys pavoninus* CV. van de Sandwichseilanden, in de groote Histoire naturelle des

Poissons naar eene teekening van WEBBER, den teekenaar van COOK's derde reis, beschreven, dezelfde soort voorstelt. Bij mijn grootste voorwêrp ontwaar ik zelfs sporen van drie breede dwarsche oranjeachtige banden op de achterhelft des ligchaams, welke in de beschrijving van *Xyrichtys pavoninus* CV. insgelijks vermeld worden.

Novacula Twistii Blkr.

Novac. corpore oblongo compresso, altitudine $3\frac{1}{2}$ ad 3 et paulo in ejus longitudine, latitudine 3 circiter in ejus altitudine, capite antice carinato obtusissimo $4\frac{1}{3}$ ad $4\frac{2}{5}$ in longitudine corporis, altiore quam longo; linea rostro-frontali ante oculos valde convexa, rostro subverticali convexiuscula; oculis diametro $4\frac{1}{2}$ ad 5 in longitudine capitis plus diametro $\frac{1}{2}$ a linea rostro-frontali remotis; osse suborbitali sub oculo oculi diametro duplo vel plus duplo altiore; naribus minimis punctiformibus; maxillis subaequalibus superiore $2\frac{3}{4}$ circiter in longitudine capitis; dentibus maxillis pluriseriatis seriebus internis obtusis, serie externa acutis internis longioribus; utraque maxilla antice caninis 2 magnis curvatis divergentibus intermaxillaribus ore clauso inframaxillares amplectentibus; regione infraoculari posteriore squamis pluriseriatis; regione operculi supero-anteriore squamis parcis; praeoperculo obtuse rotundato; squamis lateribus 27 vel 28 in serie longitudinali; linea laterali sub radiis dorsalibus penultimis interrupta, regione suprascapulari valde curvata tunc rectiuscula, singulis squamis tubulo simplice notata; pinna dorsali duplice, anteriore biradiata acuta sat alte cum pinna posteriore unita, post oculum sita, radiis flexilibus subaequalibus dorsali spinosa non multo altioribus; dorsali 2^a parte spinosa parte radiosa paulo humiliore spinis osseis pungentibus subaequalibus, membrata inter singulas spinas non emarginata, parte radiosa postice acutiuscula vel acuta radiis longissimis corpore triplo vel plus triplo humilioribus; pectoralibus acutis non emarginatis $5\frac{1}{3}$ ad $5\frac{1}{2}$, ventralibus acutis radio 1^o producto 7 ad $6\frac{2}{3}$, caudali obtusa convexa $6\frac{1}{4}$ ad $5\frac{3}{4}$ in longitudine corporis; anali antice rotundata, dorsali vix vel non altiore postice angulata; colore corpore superne et lateribus pulchre roseo- viridi, inferne roseo-margaritaceo, marginibus squamarum auran-

tiaco; iride pulchre rubra; capite antice linea media vitta rostro-nuchali coerulea; lateribus regione postscapulari sub linea laterali macula rotunda sanguinea pinna pectorali majore, inferne macula diffusa lutea limbata; pinna dorsali anteriore coerulescente radiis aurantiacis antice coeruleo marginata; dorsali posteriore parte spinosa et parte radiosa aurantiaca vitta intramarginali carmosina et vittis numerosis obliquis transversis postrorsum descendentibus dilute coeruleis; pectoralibus, ventralibus, anali caudalique membrana hyalinis radiis flavo-aurantiacis, caudali inferne pulchre rubra.

B. 6. D. 2 simpl. + 7 spin. + 12 vel 13 rad. quor. 5 anter. simplic. P. 2/10. V. 1/5. A. 3/12 vel 3/13. C. 4/12/4 lat. brev. inclus.

Synon. *Ikan Bokki* Ternat.

Habit. Ternate, in mari.

Longitudo 2 speciminum 155" et 170".

Aanm. In de groote Histoire naturelle des Poissons is naar eene teekening van PARKINSON eene otaitische soort beschreven, door PARKINSON *Coryphaena virens* en door den heer VALENCIENNES *Xyrichthys virens* genoemd. Volgens de beschrijving bezit deze soort ook eene groote ovale roode vlek achter de borstvin. Er zouden echter geene preoperkelschubben op de gemelde teekening zijn afgebeeld, terwijl daarentegen het ligchaam met roode stippen en de aarsvin met roode strepen versierd zou zijn, wat bij mijne voorwerpen het geval niet is. Ik kan haar derhalve naar de korte aanwijzing in het groote vischwerk niet tot *Xyrichthys virens* CV. terugbrengen en geef haar daarom een' eigen naam. In allen gevalle behoort zij tot Novacula, wegens haar beschubt preoperkel, indien, wat nog te betwijfelen is, Novacula met regt als een geslacht van *Xyrichthys* kan afgescheiden blijven. De Ternatanen stellen hoogen prijs op dezen visch. Zij noemen hem *Ikan Bokki*, dat is *Prinsessenvisch*, waarschijnlijk wegens zijne fraaije kleur en voortreffelijken smaak. Hij wordt in diep

water boven koraalachtigen bodem met den hengel gevangen. Tijdens mijn verblijf te Ternate maakte hij dagelijks een der tafelgerechten uit. Zeer zeker behoort hij tot de meest smakelijke en fijne visschen.

Ik het gemeend deze soort te moeten opdragen aan den heer Mr. A. J. DULJMAER VAN TWIST, als eene hulde aan den steun, die beschaving en wetenschap gedurende zijn vijfjarig bestuur van Nederlandsch Indië voortdurend van hem hebben mogen ondervinden.

MURAENOÏDEL.

Muraena lita Richds. Voy. Ereb. Terr. Fish. p. 84. Blkr
Nat. Tijdschr. N. Ind. III p. 66. Verh. Bat. Gen.
XXV Muraen. p. 47 (descriptio emendata).

Muraen. corpore elongato compresso, altitudine 17 ad 15 in ejus longitudine; capite acuto $7\frac{1}{4}$ ad $7\frac{3}{4}$ in longitudine corporis, plus duplo longiore quam alto; oculis diametro 9 ad 10 in longitudine capitis; naribus anterioribus tubulatis, posterioribus non tubulatis; linea rostro-dorsali fronte concava, rostro et vertice convexa; rostro convexo acuto oculo minus duplo longiore, non ante maxillam inferiorem prominente; rictu post oculum producto 3 circiter in longitudine capitis; dentibus palatinis nasalibusque acutis uniseriatis; dentibus palatinis utroque latere 10 ad 12 subaequalibus, nasalibus periphericis p. m. 12 conicis palatinis longioribus, nasali medio unico tantum mobili; dentibus vomerinis obtusis p. m. 20 antice biseriatis postice uniseriatis; dentibus inframaxillaribus acutis antice biseriatis, lateralibus uniseriatis, utroque latere serie longiore p. m. 18 inaequalibus, serie brevioris symphysi approximata et extrorsum sita 3 ad 5 conicis brevioribus; apertura branchiali oculo vix majore paulo infra mediam corporis altitudinem sita; linea laterali inconspicua; pinna dorsali vix ante aperturam branchialem incipiente corpore paulo plus duplo humiliore; anali postice in corporis dimidio anteriore incipiente dorsali minus duplo humiliore; corpore pinnisque flavo-umbrinis, maculis violaceo-fuscis parvis irregularibus polymorphis variegato-

reticulatis; maculis dimidio corporis superiore pinnaque dorsali confertissimis, lateribus caudaque annulos plures imperfectos vel maculas majores hexagonas longitudinaliter tri- vel quadri-seriatis efficientibus; maculis ventre pinnaque anali parciorebus.

D. 320—370 p. m. A. 210—220 p. m. C. 10 p. m.

Synon. *Muraena variegata* Mus. Britt. sec. Richds.

Habit. Ternate, in mari.

Wahai, Ceram septentrionalis, in mari.

Longitudo 4 speciminum 355''' ad 495'''.

Aanm. Mijne voorwerpen van Ternate versch hebbende kunnen observeren, ben ik in de gelegenheid geweest eene nieuwe en betere beschrijving dezer soort te geven, dan mijne vroeger gepubliceerde.

Muraena monochrous Blkr.

Muraen. corpore elongato compresso, altitudine 21 circiter in ejus longitudine; capite acuto $8\frac{1}{2}$ circiter in longitudine corporis, plus duplo longiore quam alto; oculis diametro 9 ad 10 in longitudine capitis; naribus anterioribus tubulatis, posterioribus non tubulatis; linea rostro-dorsali fronte concava, rostro et vertice convexa; rostro convexo acuto oculo minus duplo longiore, non ante maxillam inferiorem prominente; rictu post oculum producto $2\frac{1}{4}$ ad $2\frac{1}{5}$ in longitudine capitis; dentibus acutis palatinis inframaxillaribusque biseriatis, ceteris uniseriatis; dentibus palatinis utroque latere serie externa 16 p. m. inaequalibus, serie interna 3 longis mobilibus antrorsum sitis; nasalibus periphericis 12 p. m. dentibus palatinis longioribus, mediis 3 subulatis mobilibus; vomerinis conicis brevibus p. m. 7; inframaxillaribus utroque latere serie externa p. m. 24 inaequalibus, serie interna symphysi approximata p. m. 3 longis mobilibus; apertura branchiali oculo non majore paulo infra mediam corporis altitudinem sita; linea laterali poris minimis conspicua; pinna dorsali ante aperturam branchialem incipiente corpore minus duplo humiliore; anali in media corporis totius longitudine incipiente dorsali duplo circiter humiliore; corpore pinnis umbrino-fuscis nec fasciatis nec maculatis.

D. 353 p. m. A. 240 p. m. C. 12 p. m.

Habit. Ternate, in mari.

Longitudo speciminis unici 452'''.

Aanm. Deze *Muraena* behoort tot de groep van *Muraena griseo-badia* Richds, *Muraena pavonina* Richds. en *Muraena macrurus* Blkr, wat haar tandenstelsel betreft. Even als laatstgenoemde soort heeft zij ligchaam en vinnen bronsachtig bruin gekleurd, zonder vlek- of bandteekening, maar zij verschilt er overigens aanmerkelijk van, doordien bij *Muraena macrurus* de hoogte des ligchaams meer dan 40 maal gaat in zijne lengte, de kop meer dan 11 maal in de lengte des ligchaams, de oogen ongeveer 26 maal in de lengte van den kop, de binnenreijen der tanden van gehemelte en onderkaak veel talrijker zijn, de rugvin veel lager is, de aarsvin voor in het middelste derde gedeelte des ligchaams begint, de rugvin bijkans 500 en de aarsvin meer dan 300 stralen heeft, enz.

Muraena Duivenbodei Blkr.

Muraen. corpore elongato compresso, altitudine 15 circiter in ejus longitudine; capite acuto 7 circiter in longitudine corporis, plus duplo longiore quam alto; oculis diametro 9 circiter in longitudine capitis; naribus anterioribus tubulatis, posterioribus non tubulatis; linea rostro-dorsali fronte concaviuscula, rostro et vertice convexa; rostro convexo acuto oculo multo minus duplo longiore, non ante maxillam inferiorem prominente; rictu post oculum producto $2\frac{2}{3}$ circiter in longitudine capitis; dentibus acutis, palatinis biseriatis utroque latere serie externa p. m. 13 aequalibus, serie interna 8 vel 9 iis seriei externae majoribus subaequalibus; nasalibus periphericis uniseriatis p.m. 12 palatinis externis majoribus; nasalibus mediis 3 subulatis mobilibus; vomerinis uniseriatis p.m. 12 obtusiusculis; inframaxillaribus uniseriatis antice tantum biseriatis, serie longiore utroque latere p. m. 20, serie brevior utroque latere 4 conicis symphysi approximatis iis seriei longioris brevioribus; apertura branchiali oculo non vel vix majore, paulo infra mediam corporis altitudinem sita; linea laterali inconspicua; pinna dorsali ante aperturam branchialem incipiente, corpore duplo circiter humilior; anali in media cor-

poris longitudine incipiente, dorsali multo humiliore; colore corpore pinnisque olivaceo-fusco, capite inferne ventrequae aurantiaco-fusco; corpore pinnaeque dorsali maculis profunde violaceo-fuscis rotundis et oblongis vel elongatis transversis irregulariter dispositis sat sparsis.

D. 285 p. m. A. 175 p. m. C. 10 p. m.

Habit. Ternate, in mari.

Longitudo speciminis unici 258".

Aanm. Ik noem deze soort ter eere van den heer M. D. VAN DUIVENBODE te Ternate, door wiens welwillende bemoeijingen mij reeds vroeger en ook tijdens mijn verblijf te Ternate, meerdere in de wetenschap onbekende vischsoorten zijn geworden. De soort behoort volgens haar tandenstelsel tot dezelfde groep als de hier voren beschrevene *Muraena monochrous*. Zij is in die groep gemakkelijk herkenbaar aan haar bruin met ronde en langwerpige dwars geplaatste zwarte vlekken bedekt ligchaam, aan hare talrijke binnenste gehemeltetanden, betrekkelijk kort ligchaam, gering aantal rugvin- en aarsvinstralen, enz.

Scripsi Batavia Calendis Novembris MDCCCLV.
